

Wirte der *Nomada*-Arten Deutschlands

Brutparasiten	Wirte
<i>Nomada alboguttata</i>	<i>Andrena barbilabris</i> , <i>A. ventralis</i>
<i>Nomada argentata</i>	<i>Andrena marginata</i>
<i>Nomada armata</i>	<i>Andrena hattorfiana</i>
<i>Nomada atroscutellaris</i>	<i>Andrena viridescens</i>
<i>Nomada baccata</i>	<i>Andrena argentata</i>
<i>Nomada bifasciata</i>	<i>Andrena gravida</i>
<i>Nomada bispinosa</i>	<i>Halictus subauratus?</i>
<i>Nomada bluethgeni</i>	<i>Lasioglossum marginellum</i>
<i>Nomada braunsiana</i>	<i>Andrena pandellei</i> , <i>A. curvungula</i> , <i>A. paucisquama</i>
<i>Nomada castellana</i>	<i>Andrena anthrisci?</i> , <i>A. semilaevis?</i> , <i>A. alfkenella?</i>
<i>Nomada conjungens</i>	<i>Andrena proxima</i>
<i>Nomada discedens</i>	<i>Lasioglossum prasinum</i>
<i>Nomada distinguenda</i>	<i>Lasioglossum villosulum</i> , <i>L. parvulum</i>
<i>Nomada emarginata</i>	<i>Melitta haemorrhoidalis</i>
<i>Nomada errans</i>	<i>Andrena nitidiuscula</i> , <i>A. pallitarsis?</i>
<i>Nomada fabriciana</i>	<i>Andrena bicolor</i> , <i>A. chrysoseles</i> , <i>A. angustior</i>
<i>Nomada facilis</i>	<i>Andrena humilis?</i>
<i>Nomada femoralis</i>	<i>Andrena humilis</i> , <i>A. nigroolivacea</i>
<i>Nomada ferruginata</i>	<i>Andrena praecox</i>
<i>Nomada flava</i>	<i>Andrena nitida</i> , <i>A. scotica</i> , <i>A. nigroaenea?</i>
<i>Nomada flavoguttata</i>	<i>Andrena minutula</i> , <i>A. minutuloides</i> , <i>A. subopaca</i> , <i>A. semilaevis</i> , <i>A. falsifica</i>
<i>Nomada flavopicta</i>	<i>Melitta leporina</i> , <i>M. tricineta</i> , <i>M. haemorrhoidalis</i>
<i>Nomada fucata</i>	<i>Andrena flavipes</i>
<i>Nomada fulvicornis</i>	<i>Andrena pilipes</i> , <i>A. tibialis</i> , <i>A. agilissima?</i> , <i>A. thoracia</i>
<i>Nomada furva</i>	<i>Lasioglossum morio</i> , <i>L. leucopus</i> , <i>L. punctatissimum</i>
<i>Nomada fuscicornis</i>	<i>Panurgus calcaratus</i> , <i>P. dentipes</i>
<i>Nomada goodeniana</i>	<i>Andrena tibialis</i> , <i>A. nigroaenea</i> , <i>A. nitida</i> , <i>A. thoracica</i> , <i>A. cineraria</i>
<i>Nomada guttulata</i>	<i>Andrena labiata</i> , <i>A. potentillae</i>
<i>Nomada hirtipes</i>	<i>Andrena bucephala</i>
<i>Nomada integra</i>	<i>Andrena humilis</i> , <i>A. taraxaci</i>
<i>Nomada italica</i>	<i>Andrena gallica</i>
<i>Nomada kohli</i>	<i>Lasioglossum puncticolle</i>
<i>Nomada lathburiana</i>	<i>Andrena vaga</i> , <i>A. cineraria</i>
<i>Nomada leucophthalma</i>	<i>Andrena clarkella</i> , <i>A. apicata</i> , <i>A. nycthemera</i>
<i>Nomada marshamella</i>	<i>Andrena scotica</i> , <i>A. spinigera</i> , <i>A. ferox</i> , <i>A. nigroaenea</i>
<i>Nomada melathoracica</i>	<i>Andrena agilissima</i>
<i>Nomada minuscula</i>	<i>Lasioglossum glabriusculum</i> , <i>L. lucidulum</i> , <i>L. politum</i> , <i>L. semilucens</i>
<i>Nomada moeschleri</i>	<i>Andrena varians?</i> , <i>A. haemorrhoea?</i> , <i>A. lathyri?</i>
<i>Nomada mutabilis</i>	<i>Andrena chrysopyga</i>
<i>Nomada mutica</i>	<i>Andrena ferox</i>
<i>Nomada nobilis</i>	<i>Eucera interrupta</i>
<i>Nomada numida</i>	<i>Andrena morio</i>
<i>Nomada obscura</i>	<i>Andrena ruficrus</i>

Wirte der *Nomada*-Arten Deutschlands

Brutparasiten	Wirte
<i>Nomada obtusifrons</i>	<i>Andrena coitana</i> , <i>A. tarsata</i> ?
<i>Nomada opaca</i>	<i>Andrena fulvida</i>
<i>Nomada panzeri</i>	<i>Andrena varians</i> , <i>A. fulva</i> , <i>A. helvola</i> , <i>A. synadelpha</i> , <i>A. fucata</i> , <i>A. lapponica</i>
<i>Nomada piccioliana</i>	<i>Andrena combinata</i>
<i>Nomada pleurosticta</i>	<i>Andrena polita</i>
<i>Nomada posthuma</i>	<i>Lasioglossum glabriusculum</i> ?
<i>Nomada pulchra</i>	<i>Melitta melanura</i> ?
<i>Nomada rhenana</i>	<i>Andrena ovatula</i>
<i>Nomada roberjeotiana</i>	<i>Andrena tarsata</i> , <i>A. denticulata</i> , <i>A. coitana</i> ?
<i>Nomada rostrata</i>	<i>Andrena nasuta</i>
<i>Nomada ruficornis</i>	<i>Andrena haemorrhoa</i>
<i>Nomada rufipes</i>	<i>Andrena fuscipes</i> , <i>A. nigriceps</i> , <i>A. denticulata</i>
<i>Nomada sexfasciata</i>	<i>Eucera nigrescens</i> , <i>E. longicornis</i> , <i>E. interrupta</i> ?
<i>Nomada sheppardana</i>	<i>Lasioglossum nitidiusculum</i> , <i>L. sexstrigatum</i>
<i>Nomada signata</i>	<i>Andrena fulva</i>
<i>Nomada similis</i>	<i>Panurgus banksianus</i>
<i>Nomada stigma</i>	<i>Andrena labialis</i> , <i>A. schencki</i> , <i>A. decipiens</i> , <i>A. suerinensis</i> ?
<i>Nomada striata</i>	<i>Andrena wilkella</i> , <i>A. gelriae</i> , <i>A. aberrans</i> , <i>A. similis</i> , <i>A. intermedia</i>
<i>Nomada succincta</i>	<i>Andrena nitida</i> , <i>A. nigroaenea</i>
<i>Nomada symphyti</i>	<i>Andrena symphyti</i>
<i>Nomada trapeziformis</i>	<i>Andrena limata</i> ?, <i>A. barbareae</i> ?
<i>Nomada villosa</i>	<i>Andrena lathyri</i>
<i>Nomada zonata</i>	<i>Andrena dorsata</i> , <i>A. congruens</i>
Die Angaben basieren auf den in P. Westrich (2029): »Die Wildbienen Deutschlands« zitierten Publikationen.	